## NOTES

•••••
•••••
 •••••



CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER À Lyon et en Rhône-Alpes

in

28 rue Laennec 69373 Lyon Cedex 08 04 78 78 28 28 www.centreleonberard.fr



Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement :Pour joindre le secretariat de radiologie : 04 26 55 67 73

peau, afin d'être analysés, sur le

pour déterminer un diagnostic.

plan cellulaire, dans un laboratoire



www.centreleonberard.fr rubrique je suis un patient

ou un proche...







Nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information.

En cas de questions, le médecin et le personnel paramédical sont à votre disposition pour vous donner, en complément, toutes les précisions que vous souhaiteriez.

Ce geste nécessitera une hospitalisation d'au minimum 6 heures en service de chirurgie ambulatoire.

Il vous sera demandé d'être à jeun pour l'examen.





L'arrêt des anticoagulants sera nécessaire pour la réalisation de la biopsie. Pour votre retour à domicile, vous ne pourrez pas repartir seul, il vous faudra être accompagné et ne pas rester seul pendant la nuit suivant l'examen.

# Qu'est-ce que la biopsie pulmonaire ?

L'examen dure en moyenne 20 à 30 minutes. Il comprend plusieurs étapes :

Repérage de l'organe et de la lésion à l'aide du scanner

#### Anesthésie locale

L'anesthésie va s'étendre de la peau jusqu'à la cible des prélèvements. Vous pourrez ressentir des sensations d'échauffements ou de picotements, qui sont tout à fait normales.

#### Prélèvements

Le médecin radiologue va effectuer plusieurs prélèvements à l'aide d'une aiguille que vous ne sentirez plus car l'anesthésie aura fait son effet. Vous pouvez toutefois ressentir une sensation indolore de pression sous la peau.

Votre coopération est essentielle, elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de complications. Vous devez rester immobile pendant l'ensemble de la procédure.

### Quels sont les

risques?

- Pneumothorax : de l'air peut passer dans la plèvre (entre la paroi et le poumon) entraînant une douleur du dos et de l'épaule et une gêne à la respiration.

Ces signes disparaissent le plus souvent spontanément. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'évacuer cet air en insérant un petit tuyau (drain) menant à une prolongation de l'hospitalisation.

- Hémoptysie : crachats de sang de façon transitoire.

En pratique : <u>prévenez-nous</u> de la moindre gêne respiratoire, en cas de douleur persistante ou de signes anormaux tels que fièvre, frissons, vertige.

## Après l'examen?

Vous aurez une surveillance d'une durée de 6h en service de chirurgie ambulatoire (service qui vous a accueilli à votre entrée).

Vous devrez rester strictement allongé sur le brancard en vous mobilisant le moins possible, en respirant tranquillement, en évitant de grosses toux.

Une radiographie des poumons sera réalisée quelques heures après le geste afin de vérifier l'absence de survenue de complications post - intervention.

Le personnel soignant sera à votre disposition pour répondre à vos questions, pallier à d'éventuelles douleurs et organiser votre sortie avec le médecin radiologue.

Une fiche informative de sortie vous sera donnée avec des consignes et un numéro de téléphone pour nous joindre en cas de problème suite à votre examen.